

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.


If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



HEMOLYSE PHYSIOLOGIQUE ET PATHOLOGIQUE



Dr AHMIDATOU. H
Service d'hématologie
CHU Beni Messous
Cours pour externes 4^{ème} année

Plan

- Définition
- Rappel de la structure du GR
- Hémolyse physiologique:
 - mécanisme
 - lieu / siège
- Hémolyse pathologique :
 - mécanismes
 - siège
 - étiologies
- Devenir des constituants

Définition de l'hémolyse




Hémolyse physiologique= hémolyse normale

Destruction des GR au bout de 120 jours (terme de sa vie) par sénescence

Hémolyse pathologique = hyperhémolyse:

Diminution de la durée de vie des GR, la cause peut être corpusculaire ou extra corpusculaire



Structure du GR



- Cellule **anucléée**, en forme de disque biconcave de 7 à 8 $\mu\phi$
- GR :
contenant : membrane
contenu: Hb, eau, enzyme, électrolytes



➤ Membrane :

- souple
- rôle: maintien de la forme et de la déformabilité
- porte les Ag des groupes sanguins



➤ hémoglobine:


- 33% du poids du GR
- synthétisée au nv MO
- fonction : transport de l'O₂
- structure de l'Hb

Hb A : $\alpha_2 \beta_2$

Hb A₂ : $\alpha_2 \delta_2$

Hb F : $\alpha_2 \gamma_2$

- Hb chez fœtus: Hb F
- Hb chez adulte: Hb A







hémoglobine



Hb A : $\alpha_2 \beta_2$

Hb A₂ : $\alpha_2 \delta_2$



Hb F : $\alpha_2 \gamma_2$



Electrophorèse de l'hémoglobine



- enzymes (PK, G6PD):
rôle glycolytique des enz (voie principale et accessoire)



Mécanisme de l'hémolyse physiologique

- Epuisement du capital enzymatique / absence de renouvellement
- ↓ volume globulaire, ↓ ATP et glutathion réduit, ↑ Na⁺ et ↓ K⁺ intracellulaire, formation de méthémoglobine
- → modification de forme GR
- → hémolyse




siège de l'hémolyse physiologique:

système réticuloendothélial


MO 50%

rate 25%

foie 25%



macrophage




Mécanisme de compensation

Chaque jour le même nombre de GR détruit par l'hémolyse physiologique est compensé par la production médullaire, reflété par le taux de réticulocytes 0,5 à 2 % (25 000 à 120 000)

PRODUCTION = DESTRUCTION


Mécanismes physiopathologiques de l'hyperhémolyse



- Hyperhémolyse

modification constitution GR

modification environnement



❑ modification des constituants du GR:

anomalies congénitales ou acquise

la cause est intrinsèque


l'hémolyse est le plus souvent intratissulaire


exemples:

- anomalies de l'Hb : hémoglobinopathies quantitatives ou qualitatives
- déficits enzymatiques: G6PD, PK
- atteinte de la membrane : sphérocytose, elliptocytose
- HPN (hémoglobinurie paroxystique nocturne)




Anémies Hémolytiques Congénitales







B thalassemie



Cellules cible/ Hb C



drépanocytose



Frottis normal



elliptocytose



Microspherocytes

AHC

→se manifeste par une hyperhémolyse de type chronique: hémolyse à prédominance splénique sauf pour déficit G6PD



→clinique: triade d'hémolyse chronique
pâleur, ictère, splénomégalie

→biologie: anémie régénérative (rétic > 120 000)
bil directe > 10 mg/l
fer sérique souvent ↑

❑ modification de l'environnement du GR

anomalies acquises (immunologique et non immunologique) de cause extrinsèque et l'hémolyse est souvent intravasculaire


- clinique: tableau d'hémolyse aigue
triade classique: choc, oligurie, urines sélecto, dls lombaires/ abd → urgence médicale
- biologie: hémoglobinémie (plasma rosé),
hémoglobinurie, haptoglobine ↓, hémopexine ↓

Deux exceptions


- déficit G6PD → hémolyse aigue
- hémoglobinurie paroxystique nocturne → hémolyse aigue

Etiologies de l'hyperhémolyse

- ✓ **hyperhémolyse corpusculaire:**
 - constitutionnelles (anémies hémolytiques congénitales)
hémoglobinopathies → électrophorèse de l'Hb
an de la membrane → résistance globulaire
déficit enzymatique → dosage enzymatique
 - acquises: maladie de Marchiava Micheli (HPN)
- ✓ **hyperhémolyse extracorporelle:**
 - immunologique: isoimmunisation, autoimmunisation (TCD+), immunoallergique, allergie médicamenteuse
 - toxique
 - bactériennes: septicémie à *B. perfringens*
 - parasitaire: paludisme



Devenir des
constituants
Hémolyse
intratissulaire



Destin de l'hémoglobine libérée dans le plasma
Hémolyse intra-vasculaire

